

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之八

脫肛并痔症

第七十一問

湯氏方治脫肛大腸自糞門出宜用蔥湯薰洗令軟款款送上此固瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後用槐花等藥又有用一味五倍子煎湯入朴硝薰洗而縮者又有用真蒲黃碾極細以豬膽拌勻傅肛門上而入者全嬰方用澁腸散兼有痔症腫痛者用黃丹滑石等分并冰調塗卽消并用鉛白霜半錢片腦半字好酒調傅腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用若

參湯洗亦效。亦有蜜陀僧白礬片腦末傅上。更用荊芥防風等項洗之。用生括蔓根者效。

一澁腸散

治小兒久痢。大腸脫出不收。

訶子炮 赤石脂 龍骨

右爲末。臘茶少許和藥。摻腸頭上。絹帛揀入。不
治痢米湯調。又方治脫肛。五倍子焙爲末。入茶
依前方用。

丹石散

治外痔如神

黃丹

滑石

等分

右爲細末新汲水調塗口三五上

勝雪膏

治隨腸番花鼠妳等痔瘡痛不可忍或已成瘡者。拉皆治之

片腦

鉛白霜

右件各半字。用好酒少許研成膏子塗之隨手輒愈。

黃連解毒湯

治痔漏下血大腸火症

聖藥通串

不燥不

七

黃連

三錢

黃蘗

半兩

蛇子

四個

黃芩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

苦參湯

治脫肛并痔

枳殼

黃連

大黃

甘草

荆芥

苦參

赤芍藥

黃芩

各等分

右剉散每用五錢以車前子茅草同煎薰洗。

又方

用生括薑根研粉猪油溫煖投入。又用草麻子

貼頭頂上。腸即入便去草麻

便血臟毒

第七十二回

議曰。兒生七日之內。大小便有血出者。此由胎氣熱盛之所致也。母食酒麪炙煖熱物。流入心肺。兒在胎內受其熱毒。亦傳心肺。且女子熱入心。故小便有之。男子熱入肺。故大腸有之。血出淡淡。有似坯水。盛則其血加鮮。凡遇有此。不可以他藥。只以生地黃根。取自然汁。入蜜少許。和勻。溫溫與服。移時自安。男子皆效。甘露飲宜兼與服。茅根茅花煎濃湯服亦妙。犀角地黃湯亦可服。臟毒聚金丸用之效。地黃丸亦可用。

有瘀血者桃仁承氣湯下之

甘露飲

治小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿
血常欲合閉或饑煩不欲飲食及赤目腫痛不
任涼藥口舌生瘡咽喉腫疼瘡疹已發未發皆
可服之療身面皆黃腫體微腫胸膈氣滿大便
不調小便黃澀或時身熱並皆治之

熟地黃

麥門冬

去心

枳殼

去穢

甘艸

炙

山茵陳

枇杷葉

地

石斛

去虛

黃芩

生乾地黄

天門冬

各半

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓食後隨臥溫服小兒一服分作二服仍量歲數加減服

聚金丸

治大便秘下血發熱煩燥腹中熱痛作渴脉來弦數或驚熱目赤昏澁或有酒毒去血竝治之。

黃連

四兩一兩水浸曬乾一兩黃芩

防風

去蘆各一兩

右件爲細末煮麪糊丸桐子大每服五十丸量

意加減以米泔浸枳殼水下。不拘時候夏月人
大黃一兩三時不須用。或枳殼爲末。入前藥爲
末亦效。小兒丸菜豆大。亦治血痢。

犀角地黃湯

治傷寒及溫病。應發汗而不發汗。內有瘀血吐
血鼻衄。面黃大便黑。此方主消化瘀血。兼治瘡
疹出得太盛以解之。

生犀屑

如無以升
麻代之

牡丹皮

去骨各
一兩

生地黃

半斤

芍藥

七錢
半

右剉散每服三錢水一盞煎服

千金地黃丸

治心熱腸風臟毒去血。

黃連

四兩
粗末

生地黃

半兩研取汁連津二
味拌勻日中晒極乾

右末蜜丸桐子大每三十九食後麥門冬湯下

量大小加減。

桃仁承氣湯

治大便秘積下鮮血或黑

川大黃

四兩

桂皮

甘州

芒硝

各二兩

桃仁

五十一枚去皮尖雙仁諸本皆同惟外書用一伯五十

右剉散每三錢水煎服以快利爲度末利再投

大便不通

第七十三

議曰。小兒大腸熱。乃是肺家有熱。在裏流入大腸。以致秘結不通。乃實熱也。當以四順清涼飲。加柴胡。熱甚者。加山梔。黃芩。流利之。其表裏俱熱者。而黃頰赤。唇燥口乾。小便赤澀。大便焦黃。無汗者。先解表。以柴胡散汗之。解後大便秘。或肚疼者。以清涼飲。大柴胡湯。承氣湯。皆可下之。積熱者。神芩丸尤妙。

四順清涼散

通順大腸。令無壅閉。

赤芍藥

當歸

甘草

大黃

各等分

右吹咀三歲已上每服一錢水一盞煎七分作兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘艸不利減大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減微瀉利為度可加荊芥。

柴胡散 治木便不通

石膏

黃芩

甘艸

赤芍藥

葛根

各一分

麻黃

去節

柴胡

半兩

右吹咀三歲兒每服一錢水一小盞生薑少許

蔥白三寸。豉二十粒煎五分去滓溫服不拘時
出汗為效治熱嗽加杏仁五味子各二錢

大柴胡湯 治大便秘結蓄熱于內

柴胡 去蘆八錢 黃芩 赤芍藥 各三錢

半夏 湯泡七次切片 枳實 去穢麩炒半錢

右㕮咀薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩

大承氣湯 治邪熱結于胃中及宿積不去

大黃 芒硝 各半兩 厚朴 一兩 枳實 二枚

右剉散每服三字薑三片煎服。

神考九

治熱積于內大便閉塞

大黃

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

滑石

四兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十九食後
溫水下。一方加蒲黃止血症用

輕疏散

治見初生大便不通

輕粉

一分
蜜少許

右以熱湯調開蜜糊輕粉點兒口卽通與一二
次再不可與

小便不通

第七十四

湯氏云凡小兒小便不通皆因心經不順或伏熱或驚起心火上攻不能降瀉腎水不能上升故使心經愈熱而小腸與心合所以小便不通木通湯主之甚者八正散又小便不通臍腹脹悶心神煩熱梔子仁散主之積熱者神芩丸效

木通湯

治小便不通小腹疼痛

木通

滑石

各兩

黑牽牛

炒各兩

右咬咀燈心蔥白煎去滓大小加減以意

八正散

治小兒心經邪熱。一切蘊毒。咽乾口燥。大渴引飲。心忪面熱。煩燥不寧。目赤睛疼。唇焦鼻衄。口舌生瘡。咽喉腫痛。及治小便赤澀不通。熱淋血淋之症。

車前子

瞿麥

滑石

大黃

濕紙裹

山梔

扁蓄

木通

甘艸

右判散。每二錢。水一盞。入燈心。煎七分。去渣。溫服。食後臨臥。小兒量力。少少與服。

黃號散

治七日小便不通

葱白

三四寸

人乳

右件同搗如泥付兒口內卽與乳下

梔子仁散

治小兒小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁

五枚

茅根

剉

冬葵子

各半兩

甘艸

減半

右剉散每服立錢米一小盞煎五分去滓不拘

時候溫服

神芎丸

治症見前大便不通并治小便不利

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

二兩

滑石

四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十九食後
溫水下。一方加蒲黃止血症

大小便不通

第七十五問

議曰調理嬰孩傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚
夾食寒熱大小便閉澀不通煩燥作渴冷汗妄流夾
積傷滯膈滿脹急青黃體瘦日夜大熱及療傷風傷
暑驚癇客忤腎臟疳氣等熱並宜脫甲散主之亦可
服大連翹湯加大黃神芩治小兒驚風積熱大小便
澀滯其效尤速又掩臍法用連根蔥一根不洗帶泥
王生薑一片豆豉二十一粒鹽二匙同研爛捏餅烘
熱掩臍中以綿扎定良久氣透自通不然另換一劑

小便不通亦可前一問通用

脫甲散

治大小便不通

柴胡

去蘆

當歸

洗

龍膽

去蘆

白茯苓

各二錢半

人參

二錢

知母

甘州

炙

川芎

各三錢

右判散每服二錢水一小盞連翹蔥白三寸煎

至半盞溫服不拘時此方散熱扶表救裏表虛

令汗不妄行裏熱令氣不閉結外即通關內即

開渠通關流行經絡開渠不壅臟腑熱在表裏

之間施無不可積傳驚之痼用立見功

大連翹湯

治二便閉結

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

蟬蛻

柴胡

活石

甘艸

炒各錢山梔仁

黃芩

各五分

右剉細每服一錢加紫草煎濃服熱甚加大黃

更詳症加減爲佳

神效丸

治二陰並閉

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

二兩

滑石

四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末。滴水丸桐子大。每服四五十丸。食後

溫水下。一方加蒲黃止血症用

掩臍法

治大小便不通

海螵

四十粒

蔥根

帶土七個

黑豆

七個

搗

少許

右同研爛捏成一餅烘熱放臍上以帛扎定久

則自通

五淋

第七十六問

錢氏云。小兒諸淋者。腎與膀胱熱也。膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸。下于胞。行于陰。爲小便也。膀胱熱。則津液內溢。水道不通。停積于胞。腎氣熱。則虛故令水道不利。小便淋瀝。故謂之淋。其狀小便出少而數。其小腹急痛。引臍是也。又有石淋。氣淋。熱淋。血淋。寒淋。五淋形症。各有說焉。其石淋者。淋而出砂石也。腎與熱所乘。則化爲石。小便莖中痛。尿不能卒出。時自痛。引膀胱裏急。砂石從小便而出也。其氣淋者。腎

與膀胱受肺之熱氣則脹氣爲熱所乘故流入膀胱則氣壅不散小腹氣滿水不宜利故小便澀而成淋也其熱淋者三焦有熱氣得于腎與膀胱故熱氣流入于胞而成淋也其血淋者是熱之盛甚則尿血帶之血淋心主血其熱甚者血則散漫失其常經滲入胞而成血淋矣若熱淋者其病狀先寒戰然後尿是也小兒取冷過度下焦受之冷氣入胞于正氣交爭與正氣相勝則戰寒氣解故得小便也治淋之散立效五苓散木通散等劑機變用藥必可

求在導赤散亦效。與大方脉相參用藥不亦可乎。

金砂散

治小便淋瀝不通

鬱金

海金沙

滑石

甘艸

各等分

右爲末。三歲兒一錢。煎落蒂湯調下。燈心木通湯亦可。冬瓜最治小兒小便不通。淋瀝并渴。

立效散

治小兒諸淋不通。莖中疼痛。

木通

甘艸

白孩兒花

名王不留行

胡荽

滑石

海金沙

山梔

檳榔

各等分

石剉散每服二錢水半盞煎三分去滓服

木通散

治小兒小便不通小腹疼痛

木通

滑石

各兩

黑牽牛

炒字兩

右爲粗末燈心蔥白煎去滓大小加減以意

遺尿 第七十七問

巢氏云遺尿者此由膀胱有冷不能約于水故也腎主水腎氣下通于陰小便者水之餘也膀胱爲津液之府既冷氣衰不能約水故遺尿也楊氏云小兒尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出宜破故紙散治之益智之劑亦不可闕

破故紙散

治小兒夜間尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出

破故紙

右一味炒爲末熱湯調下

又方

益智生

白茯苓

去皮 茯神 去皮
等分

右爲細末空心清茶調下亦治白濁

又方

五倍子

一半生一半燒存性

右爲末雪糕爲丸每服三十粒米飲下

尿白濁

第七十八調

湯氏曰。小兒尿白者。由乳哺不節。過傷子脾。故使清濁不分。而尿白如米泔也。久則成疳。亦心脾伏熱。兼而得之。宜疎脾土。消食化積。通利小腑也。茯苓散主之。三棱散消食丸可選而用之。分清飲亦可服。

茯苓散

治小兒尿白如米泔。因乳哺失節。有傷于脾。致使不分清濁。而色白也。久則成疳。亦心脾伏熱。兼而得之。

三稜 蓬朮 煨 縮砂仁 赤茯苓 各半

三稜 蓬朮 煨 縮砂仁 赤茯苓 各半

青皮 陳皮 滑石 甘艸 微炒 各半

右爲末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下。

三稜散

治小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使不

分清濁而白也久則成疳宜疎土消食化積

三稜 蓬朮 煨 益智 甘艸

神麴 炒 麥蘖 炒 橘皮 各半

右爲末每服一錢白湯調下。

分清飲

治通心氣補漏精治小便餘瀝并赤白濁

益智仁

川草薢

石菖蒲

鹽炒

天台烏藥

各等分

右爲細末入些子鹽空心服或燈心煎湯調下
可加茯苓白芍藥

疳症 第七十九篇

仲陽云諸疳皆脾胃之病。內亡津液之所作也。因大病或吐瀉後。以藥吐下。致脾胃虛弱。內亡津液。且小兒病疳。皆庸醫之所壞。病如潮熱。是脾臟虛。一臟實而內發虛熱也。法當補母而瀉本。臟則愈。假令中日發潮熱。是心虛熱也。肝爲心母。則宜先補肝。肝實而後瀉心。心得母氣而內平。而潮熱愈也。醫見潮熱。妄謂其實。乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之。既利多矣。不能禁約而津液內亡。卽成疳也。又有病癰。其疾發作

寒熱飲水。腸下有形。硬痛。治癖之法。當漸消磨。醫反以巴豆礪砂輩下之。小兒易虛易實。下之既過。胃中津液耗損。漸以疳瘦。楊氏曰。小兒臟腑嬌嫩。飽則易傷。乳哺飲食。一或失常。不爲疳者鮮矣。則疳以傷得恣食甘肥粘膩。生冷鹹酸。以滯中脘。則疳因積成。或乳母寒暄失理。飲食乖常。喜怒房勞。卽與兒乳。則疳因母患傳氣而入。此非病家不能調適之過乎。疳之爲候。頭皮光急。毛髮焦稀。腮縮鼻乾。口饒唇白。兩眼昏濛。揉鼻搏眉。大目聳體黃。闔牙咬甲。焦渴自汗。尿白。

有酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土
而飲水飲者皆其候也。夫疳曰五疳。病關乎五臟以
別之心疳卽驚疳。外症身體壯熱臉赤唇紅。口舌生
瘡。胸膈煩悶。小便赤澀。五心煩熱。盜汗發渴。咬牙虛
驚是也。肝疳卽風疳。外症搖頭揉目。白膜遮睛。眼青
多淚。頭焦髮立。筋青腦熱。躁渴汗多。下利瘡癰是也。
腎疳卽急疳。外症腦熱肌削。手足如冰。寒熱時來。滑
泄肚痛。口鼻乾渴。齒齦生瘡。爪黑面黧。身多瘡疥。是
也。肺疳卽氣疳。亦名疳蠱。外症咳嗽喘逆。壯熱惡寒。

皮膚粟生鼻痔流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脈毛焦
泄利頻併是也脾疳卽食疳亦名如瘕外症身面俱
黃壯大脚細吐逆中滿水穀不化泄下酸臭合面困
睡減食喫泥是也諸疳宜大蘆薈丸肥兒丸胡黃連
丸地黃丸生熟地黃湯皆要藥也集聖丸噎疳散胎
連丸五疳良方至聖丸通神丸天麻丸地黃清肺飲
化蠶丸靈脂丸下蟲丸龍膽丸黃連丸香薷丸木香
丸褐丸子黃耆湯髓血煎蚶蚶丸厚朴丸等劑對症
詳明施治

大蘆薈丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蘼莢

去蘆薈

木香

青皮

雷丸

破開白佳赤者殺人勿川

鶴虱

微炒各半兩

麝香

二錢另研

右爲細末粟米飯丸菜豆大米飲下一二十九

不拘時服

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太早或患臟腑胃虛癆諸般疳化虫治黃瘦肚急消疳可常服退疳熱

黃連

局方加肉豆蔻

陳皮

去白局方去此用木香

神麴

炒局方有史君子

麥蘖

炒各一兩加三鞭蓬朮

白蕪荑

半兩局方用檳榔

川練子

一兩去核炒

右為末神麴糊丸麻子大每服三十九空心米

飲吞下

又方

三稜

煨

蓬朮

煨

川練子

龍膽草

黃連

各四錢

柴胡

地骨皮

各半兩

枳殼

炒

麥蘖

當歸

各三錢

白蕪荑

二錢

蘆薈

木香

各一錢

右爲末神麴糊丸麻子大每服三十丸米飲下

胡黃連丸

治痢如神

胡黃連

黃連

各半兩

硃砂

二錢半另研

右上物爲細末研入硃砂末却填入猪膽內用漿煮以杖子於銚子上川線釣之勿令着底候一炊久取出研入蘆薈麴香各二錢半飯和丸麻子大每服五七丸至一二十丸米飲食後一作食前治痢症有熱

又方

治嬰孩一切疳疾及一切虛痢。他藥無功。此藥極效。

胡黃連

黃連

蘆薈

肉豆蔻

煨

桂心

人參

硃砂

麝香

史君子

木香

釣藤

龍齒

白茯苓

各等分

右爲末。取豬膽兩枚。裂汁和末。令勻。却入袋內。盛之以繩扎定。湯煮半日。取出。切破袋子。更

入葇荑子二錢微炒黃丹一錢一味別研如粉
入前藥和勻搗五百杵為丸如棗豆大但是疳
與痢用粥飲下五七丸幼者三丸不喫粥飲乳
頭令吮能治一十二種疳痢及無辜疳之症功
效非常

吳希亮疳方

治一切疳

三稜

煨

蓬朮

煨

神麴

炒

麥蘖

炒各半兩

青皮

陳皮

烏梅肉

蕪荑仁

胡黃連

百草霜

雷丸

錢各三

玄胡索

炒

甘艸各二錢 巴豆五十粒 加川練子史君子亦可

右爲末合了。先用一兩入巴豆五十粒丸如麻

子太每服五七丸米湯下。大小以意增減。

地黃丸 治腎病

熟地黃八錢 赤茯苓 山茱萸肉

當歸 川練肉 牡丹皮 山藥

澤瀉 史君子肉 各錢

右爲末蜜丸如桐子大每服三丸溫水化下。

生熟地黃湯 升眼開

治疳眼閉合不開內有朦霧

生地黃

熟地黃

各半兩

川芎

赤茯苓

枳殼

炒

杏仁

水浸去皮

川黃連

半夏麴

天麻

地骨皮

甘艸

炙

當歸

各二錢半

右剉散每服二錢薑三片黑豆十五粒水一盞

煎至六分空心溫服

脾積丸

治疳積妙

山查子

青者多用

香附子

烏藥

紫金皮 砂仁

甘艸 各等分

右爲末。山查子生用。搗碎成末。米糊丸。桐子大。米飲下。三五十丸。大人小兒皆可服。

集聖丸

治諸疳通川

蘆薈

五靈脂

夜明沙

焙

縮砂

橘皮

青皮

去穰

蓬朮

煨

木香

各二錢

黃連

史君子

蝦蟇

炙焦各三錢

右爲末。雄猪膽二枚。取汁和藥。入糕糊丸。麻子大。每服十五丸。米飲下。疳勞瘦弱。本方加當歸。

一錢半川芎三錢

噤疳散

治疳

蘆薈

黃連

各一錢

瓜蒂

猪牙皂

蝦蟇灰

各半兩

麝香

少許

右末吹入鼻內噤出可療

疳連丸

治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連

五靈脂

右爲末。獾猪膽汁丸。麻子大。每服十五丸。米飲

下五疳潮熱慎勿用大黃黃芩。

五疳良方

治疳

川黃連

蕪荑仁

神麴

炒

麥蘖

炒

陳皮

木香

蝦蟇

燒存性
各一兩

史君子

三十個
煨去殼

肉豆蔻

生
二十個

雞心檳榔

二個

麝香

一字

右爲細末。雄猪膽二箇。取汁入好酒打清麪糊。

九芥子大。每服十五九米飲下。

茯苓九

治心疳與驚疳

扶神

蘆薈

琥珀

黃連

淨洗

赤茯苓

各三錢

釣藤皮

遠志肉

薑製焙乾

蝦蟇灰

各二錢

石菖蒲

麝香

少許

右爲末。粟米丸。麻子大。每服十九。薄荷湯下。

神效換肌丸

治小兒脾疳。肌瘦潮熱。盜汗。飲食易傷。臟腑不

調。泄瀉。糟粕不化。頭大腹急。

川黃連

炒

鼈甲

酒炙

肉豆蔻

炒

史君子

神麴

炒

麥芽

炒各半兩

麝香

半錢

訶子肉

半錢

右爲末。麩糊丸如芥子大。米湯下。量大小加減。
天麻丸 治肝疳風疳疔

青黛 川黃連 天麻 五靈脂

夜明沙 微炒 川芎 盧菴 各二錢 龍膽草

防風 蟬蛻 去足各一錢 全蝎 二枚

麝香 少許 乾蟾頭 炙

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸如麻子大。每服十九。
薄荷湯送下。

地黃清肺

治肺熱疳鬲咳嗽氣逆者喘壯熱惡寒

桑白皮

炒半兩

紫蘇

北訥胡

防風

赤茯苓

黃耆

天門冬

去心

當歸

連翹

桔梗

生地黃

甘艸

炙各二錢五分

右剉散每服二錢水煎食後服。

化鬲丸

殺毒虫聖方

蘇莢

蘆薈

青黛

川芎

白芷稍

胡黃連

川黃連

煅礬灰

各等分

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸。麻子大。每服二十九。
食後臨臥杏仁煎湯下。其鼻常用熊膽泡湯小。
筆蘸洗。俟前藥各進數服。却用青黛當歸赤小。
豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等藥均分。雄黃少許細。
末入鼻欬瘡。

靈脂丸 治脾肝食滯

白豆蔻 炒 麥蘗 炒 五靈脂 縮砂仁

蓬朮 煨 青皮 史君子 橘紅

蝦蟇 炙焦各一錢

右爲末。米糊丸。麻子大。每服十九。米湯下。

下蟲丸 治疳蚘諸蟲

苦練根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去皮焙

檳榔

各二錢

鶴虱

炒

輕粉

各半錢

乾蝦蟇

炙焦三錢

史君子

五斗个環取肉川

右爲末。飛麴糊丸。麻子大。每服二十九。天明清肉汁下。內加當歸川黃連各二錢半。治脊疳兼

疳勞。

龍膽丸

治腦疳腦熱餅瘰

龍膽州

川升麻

苦練根皮

赤茯苓

蘆薈

防風

油髮灰

各二錢

青黛

黃連

各三錢

右爲末猪膽汁浸糕九麻子大每二十九薄荷

湯下食後仍以蘆薈末入鼻

黃連丸

治疳勞疳渴乾疳

黃連

牛兩淨猪膽汁浸一夜晒乾

括藎根

烏梅肉

杏仁

浸去皮焙

石蓮子

各二錢

右爲末。猪膽浸糕糊。大麻子大。每服十五丸。煎烏梅薑蜜湯下。又療患後附消渴方論式藥可。

治疳渴及五乾疳。

香薷丸 治疳渴

黃連 三炒 肉豆蔻 生 木香 訶子 煨

縮砂仁 茯苓 各二錢

古爲末。揉飯丸。麻子大。每十五丸。食前米飲下。

木香丸 治疳痢

治疳痢。冷熱不調。五色雜下。裏急後重。

黃連

淨三錢

木香

紫厚朴

薑少

縮砂仁

夜明沙

隔紙炒各二錢

訶子肉

煨一錢半

右爲末。粳米飯丸。麻子大。每十五丸。乾艾葉生

薑煎湯食前溫服。

褐丸子

治疳腫脹

萊菔子

炒一兩

陳皮

青皮

去白

檳榔

黑牽牛

取淨半生半炒

北五靈脂

赤茯苓

蓬朮

煨各半兩

木香

二錢半

爲末。麪糊丸。如菉豆大。每服十五丸。紫蘇葉

白湯送下。

黃耆湯

治疴勞咳嗽不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲進而不剋化。

黃耆 當歸 川芎 白芍藥

生地黄 蛇蛻去足炙焦 鹽田醋炙焦 各三錢

人參 白茯苓 陳皮 半夏麴

柴胡 史君子 甘艸炙各一錢

右剉散每服二錢薑棗煎食前服。

龍血煎

治疳勞

蕉蕒

柴胡

川芎

各一兩

人參

半兩

史君子

二十一个

胡黃連

川黃連

各兩

右用龍血一盞。吳茱萸一兩拌和二黃連。淹一

宿。次早炒乾。揀出茱萸并血。只用二黃連夾塗

藥拌末。粟米糊丸。麻子大。每二十九食前服。

阿坡丸

治無辜諸疳。一服虛熱退。二服煩渴止。三服寫

前住

蟾蜍

一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者其身上多癰毒

右取糞蟲一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與蟲走却將蟾蜍打死頓在蟲中任與蟲食一日一夜次以新布袋包繫定置之急流水中浸一宿取出瓦上焙爲末麝一字揉飯糊丸麻子大每二三十九米飲下

君朴丸

治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子

張

厚朴

製

黃連

各一兩

木香

三錢

右爲米糊丸如小豆大。三歲二十九丸。米湯下。三
五服效。

疔傷 第八十問

楊氏云五疔出蟲五臟疔也其餘曰餉疔曰脊疔曰腦疔曰乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔痢曰疔腫脹曰疔勞曰無辜疔曰丁奚曰哺露其狀非一不可不撮其要而條析之五疔出蟲者疔傷之源雖起于乳哺不調然臟腑停積已久莫不化而爲蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出于頭項腹背之間黃白或赤者可治青黑者難療也蝨疔者失乳飯蚤食肉太蚤或傷胃停畜積膩化爲蝨蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛

肚脹青筋唇口紫黑搖頭齒痒是也脊疳者蟲食脊
脊身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴脊骨
如鋸齒或十指皆癢頻嚙爪甲是也腦疳者胎中素
挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如
小髮結如穗遍身多汗頭腫顙高也乾疳者瘦悴少
血舌乾其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身
熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其
病在肺搭口癡眠胸脘乾渴其病在脾總爲五疳也
疳海者臟中風有甘氣加之乳母恣食五辛酒麪炙

傳使兒心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則泄
止是也疳瀉者毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下
精粕是也疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停
積宿滯水穀不聚須下惡物是也疳腫脹者虛中有
積其毒氣交併故令腹肚腫脹由是脾復受濕故令
頭面脚手虛浮是也疳勞者潮熱往來五心煩熱手
足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸咳嗽枯悴是也或
渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治
無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不

疼。其間有蟲如米粉。不速破之。則蟲隨熱氣流散。淫食臟腑。以致肢體癱瘓。便利膿血。壯熱羸瘦。頭露骨高是也。針刺破。用膏藥貼。或澣濯兒衣。露于簷下。爲雌鳥落羽所惡汚。兒著此衣。蟲致皮毛。亦致無辜之疾。兒衣已曬。須微火烘之。其若手足極細。項小骨高。尻削體痿。腹大臍突。號哭胸陷。或生穀癰。是爲丁奚。虛熱往來。頭骨分開。翻食吐蟲。煩渴嘔噦。是爲哺露。皆因脾胃久虛。不能消化水穀。以致精神減損。無以榮其血氣。故肌肉銷燬。腎氣不足。復爲風冷所傷。使

形骨枯露亦有胎中受毒臟腑血少致之此皆無辜
疔傷數種之疾病而至此不幾殆哉宜肥兒丸大蘆
薈丸五疳丸胡黃連丸至聖丸扶神丸天麻丸地黃
丸十全丹香薷丸褐丸子消食丸鼈甲丸下蟲丸集
聖丸黃雞煎丸等藥及早治之方爲全美又有疔傷
久利腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之症或以
走馬命名蓋齒屬腎腎虛纔受熱邪疔氣直奔上焦
故以走馬爲喻初作口氣名曰臭息次第齒黑盛則
齲爛熱血迸出曰宣露甚者齒皆脫落治之之法用

銅綠生蜘蛛細研入麝少許合和擦齒如無蜘蛛用其殼亦可

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太早患臟腑虛化虫治黃瘦肚急消瘳可常服之退身熱

黃連

肉方加豆蔻

陳皮

去白局方去此用木香

神麴

炒局方用史君子

麥蘖

炒各一兩加三棱蓬朮

白蕪荑

半兩局方用檳榔

川練子

去杉一兩

右爲末神麴九麻子大每三十九空心米湯下

大蘆薈丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

三黃蘗

木香

青皮

雷丸

破開白者佳者發人勿附

鷓鴣

炒各半兩

麝香

二錢另研

右爲末。粟米飯九蒸。豆豉水浸下。二十九無時。

五疳良方

治疳

川黃連

蕪荑

取

神麴

炒

麥蘖炒

陳皮

木香

蝦蟇

燒存性各一兩

史君子

三十個煨去殼

肉豆蔻

二個

雞心檳榔

二個

右爲末。入麝少許。雄

膽二枚。取汁入好酒打

清麪糊丸。芥子大。每十五丸。米飲下。

胡黃連丸

治瘡

胡黃連

黃連

各半

朱砂

二錢半
另研

右上物爲細末。研入朱砂末。却填入猪膽內。用漿煮。以杖子於銚上用綫釣之。勿令着底。候一炊久。取出。研入蘆薈。麝各二錢五分。飯糊丸。如麻子大。每服五七丸。至一二十丸。米飲食後。一
作食前。治疳症有熱。

集聖丸

治疳通用

黃連

五靈脂

夜明沙

焙

縮砂

仙皮

青皮

蓬朮

煨

木香

各二錢

黃連

史君子

煨川肉

蝦蟇

炙焦各三錢

右爲末雄猪膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲下瘡勞瘦弱本方加當歸

一錢川芎三錢

天麻丸

治肝疳風疳疳眼

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

夜明沙

微炒

川芎

蘆薈

各二錢

龍膽艸

防風

蟬退

去足各一錢半

全蝎

二枚焙

麝香

少許

乾蟾頭

炙焦
三錢

右爲末猪膽汁浸糕糊丸如麻子大每服十丸

薄荷湯下

地黃丸

治腎肝

熟地黃

八錢

赤茯苓

山茱萸肉

當歸

山藥

川練肉

牡丹皮

澤瀉

各三錢

史君子肉

各三錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三丸溫水化下

茯神丸

治心肝驚風

茯神

薑黃

琥珀

黃連

赤茯苓

各三錢

釣藤皮

遠志肉

薑製焙乾

蝦蟇灰

各二錢

石菖蒲

麝香

少許

右爲末粟米糊丸麻子大每服十丸薄荷湯下

十全丹

治丁癸而露

青皮

陳皮

川芎

五靈脂

蓬朮

白豆蔻

檳榔

蘆薈

各半

史君子

焙

蝦蟇灰

木香

各三錢

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每二十丸米

飲下有熱薄荷湯下。

湯氏十全丹

治丁奚哺露。夫哺露者，因乳哺不調，傷於脾胃，致令脾胃虛弱，漸不能食，血氣減損，肌肉不榮，而柴骨羸露，其臟腑之氣不宜，則汲汲苦熱，謂之哺露也。宜服麝香進食丸。

檳榔

枳殼

湯浸去穰
麝皮炒

青皮

去穰

陳皮

三稜

煨

蓬朮

煨

砂仁

炒各
半兩

丁香

木香

二錢

香附

炒一兩

右為末神麴糊丸黍米大空心食前下一百丸

香薷丸 治痢瀉

黃連 炒 肉豆蔻 生 木香 訶子

縮砂仁 茯苓 各二錢

右為末揉飯丸麻子大每十五丸食前米飲下

褐九子 治痢腫脹

羅布子 一兩 微炒 陳皮 青皮

檳榔 黑牽牛 取淨半生半炒 北五靈脂

赤茯苓 蓬朮 煨各半兩 木香 二錢半

右為末麪糊丸菜豆大每服十五丸紫蘇湯下

消食丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃
為水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺
消化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣
乳食正顏容

縮砂仁

橘皮

三稜

煨

蓬朮

煨

神麪

炒

麥蘖

炒各五錢

香附

炒一兩

右為末麪糊丸菜豆大食後紫蘇湯下二十九

龍甲丸

治小兒無辜疳腹中毒氣四肢瘦弱宜服

龍甲

醋塗炙令黃去裙爛

黃連

枳殼

夜明沙

微炒各一兩

訶藜勒

二枚一生一熟

麝香

一字 蠟虎一枚 推令微炙

右爲末煉蜜丸菜豆大每以粥飲下五九日三服量兒大小加減服之

蒸雞丸

治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食

不生肌肉。日夜啼多渴少食。

黃連 二兩

鶴虱

蕪荑

各半兩

柴胡

秦艽

知母

丹參

史君子

去殼一兩

右爲末。黃雄雞一隻。約斤餘。籠之。專以火麻子

飼之。至五日後。去毛令淨。於背上開孔。去腸肚

淨。拭乾。令前藥入雞腹內。以綫縫之。小甌先以

黑豆鋪甌底。厚三寸。安雞在甌中。四旁將黑豆

圍裹上。以黑豆蓋之。自日出蒸至晚。候溫冷。取

雞淨肉。研和得所。如硬入酒麪糊。同藥末爲餅。

如小豆大二歲二十九以意加減米湯下無時

如十五歲以溫酒送下忌食猪肉黃雌雞肉

下蟲丸

治疳蝕諸蟲

苦練根皮

酒浸焙

貫衆

綠色

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去尖

檳榔

各二錢

鶴虱

炒

輕粉

各五錢

蝦蟇

炙焦

史君子

五十個

右爲末飛麪糊丸麻子大每二十九天閉清肉

汁下內加當歸黃連各二錢半治脊疳兼疳勞

集聖丸

治諸疳通用

蘆薈 五靈脂 夜明沙 焙 陳皮

青皮 蓬朮 煨 縮砂 木香 各二錢

黃連 史君子 煨取肉 蝦蟇炙 焦各三錢

右為末雄猪膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲下疳勞瘦弱本方加當歸一錢半川芎三錢

經驗黃雞煎丸

柴胡 知母 秦艽 洗淨 川練鰻 切

宜黃 各兩 胡黃連 蘆薈 鶴虱

燕蕘

檳榔

丹參

川芎

神麴

炒

麥蘖

炒

青皮

五靈脂

各半兩

史君子肉

一兩半

水銀粉

一錢

麻子

五兩

黑豆

五升

右藥依前方修合

梅肉丸

治小兒諸疳煩渴飲水不止

艸龍膽

定粉

烏梅肉

炒

黃連

蒸各等分

右爲末煉蜜丸黍米大每二十九溫水送下

嬰童百問卷之八